

## 【乳幼児期の予防接種一覧】

| 予防接種名   | 予防する病気                     | 対象年齢（標準的な接種時期）                       | 接種回数（標準的な接種間隔）   |
|---------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| ロタ      | ロタウイルス胃腸炎                  | 生後6週0日～生後24週0日まで<br>（生後2か月～）         | ロタリックス：2回<br>（1回目を接種後、27日以上の間隔をあけて2回目を接種）                    |
|         |                            | 生後6週0日～生後32週0日まで<br>（生後2か月～）         | ロタテック：3回<br>（27日以上の間隔をあけて3回接種）                               |
| B型肝炎    | B型肝炎ウイルス感染による肝炎、肝硬変、肝がん    | 生後2か月～1歳の誕生日前日まで                     | 3回<br>（1回目を接種後、27日以上の間隔をあけて2回目を接種し、1回目から139日以上の間隔をあけて3回目を接種） |
| ヒブ      | インフルエンザ菌b型による気管支炎、髄膜炎、肺炎など | 生後2か月～5歳の誕生日前日まで<br>（生後2か月～7か月の前日まで） | 初回3回<br>（27日以上の間隔をあけて3回）                                     |
|         |                            | 生後2か月～5歳の誕生日前日まで                     | 追加1回<br>（初回の3回目接種後、7か月～13か月の間隔をあけて1回）                        |
| 小児用肺炎球菌 | 肺炎球菌による中耳炎、細菌性髄膜炎、肺炎など     | 生後2か月～5歳の誕生日前日まで<br>（生後2か月～7か月の前日まで） | 初回3回<br>（27日以上の間隔をあけて3回）                                     |
|         |                            | 生後2か月～5歳の誕生日前日まで                     | 追加1回<br>（初回の3回目接種後、60日以上の間隔をあけて1回）                           |
| BCG     | 結核                         | 1歳の誕生日前日まで<br>（生後5か月～8か月の前日まで）       | 1回   |
| 四種混合    | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ         | 生後2か月～7歳6か月の前日まで                     | 初回3回<br>（20日～56日までの間隔をあけて3回）                                 |
|         |                            |                                      | 追加1回<br>（初回の3回目接種後、12か月～18か月の間隔をあけて1回）                       |
| 五種混合    | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ      | 生後2か月～7歳6か月の前日まで                     | 初回3回<br>（20日～56日までの間隔をあけて3回）                                 |
|         |                            |                                      | 追加1回<br>（初回の3回目接種後、6か月～18か月の間隔をあけて1回）                        |
| MR混合    | 麻しん（はしか）、風しん               | 1歳～2歳の誕生日前日まで                        | 1期：1回  |
|         |                            | 小学校就学前（年長）の学年の4月1日～3月31日まで           | 2期：1回  |
| 水痘      | 水痘                         | 1歳～3歳の誕生日前日まで                        | 2回<br>（6か月～12か月の間隔をあけて2回）                                    |
| 日本脳炎    | 日本脳炎                       | 生後6か月～7歳6か月の前日まで<br>（3歳～）            | 1期初回2回<br>（6日～28日までの間隔をあけて2回）                                |
|         |                            | 生後6か月～7歳6か月の前日まで<br>（4歳～）            | 1期追加1回<br>（初回の2回目接種後、概ね12か月の間隔をあけて1回）                        |