

## 【乳幼児期の予防接種一覧】

予防接種名	予防する病気	対象年齢（標準的な接種時期）	接種回数（標準的な接種間隔）
ロタ	ロタウイルス胃腸炎	生後6週0日～生後24週0日まで （生後2か月～）	ロタリックス：2回 （1回目を接種後、27日以上の間隔をあけて2回目を接種）
		生後6週0日～生後32週0日まで （生後2か月～）	ロタテック：3回 （27日以上の間隔をあけて3回接種）
B型肝炎	B型肝炎ウイルス感染による肝炎、肝硬変、肝がん	生後2か月～1歳の誕生日前日まで	3回 （1回目を接種後、27日以上の間隔をあけて2回目を接種し、1回目から139日以上の間隔をあけて3回目を接種）
小児用肺炎球菌	肺炎球菌による中耳炎、細菌性髄膜炎、肺炎など	生後2か月～5歳の誕生日前日まで （生後2か月～7か月の前日まで）	初回3回 （27日以上の間隔をあけて3回）
		生後2か月～5歳の誕生日前日まで	追加1回 （初回の3回目接種後、60日以上の間隔をあけて1回）
BCG	結核	1歳の誕生日前日まで （生後5か月～8か月の前日まで）	1回
五種混合	ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ	生後2か月～7歳6か月の前日まで	初回3回 （20日～56日までの間隔をあけて3回）
			追加1回 （初回の3回目接種後、6か月～18か月の間隔をあけて1回）
MR混合	麻しん（はしか）、風しん	1歳～2歳の誕生日前日まで	1期：1回
		小学校就学前（年長）の学年の4月1日～3月31日まで	2期：1回
水痘	水痘	1歳～3歳の誕生日前日まで	2回 （6か月～12か月の間隔をあけて2回）
日本脳炎	日本脳炎	生後6か月～7歳6か月の前日まで （3歳～）	1期初回2回 （6日～28日までの間隔をあけて2回）
		生後6か月～7歳6か月の前日まで （4歳～）	1期追加1回 （初回の2回目接種後、概ね12か月の間隔をあけて1回）